

PALOMILLA DE LA PAPA (Phthorimaea operculella)



En el área de influencia de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Huatabampo en el presente ciclo agrícola otoño invierno 2019-2020 se establecerá una superficie aproximada de 2,650 hectáreas, correspondiendo 2,629 hectáreas a la zona del Bajo Rio Mayo y 21 hectáreas en la región Fuerte Mayo.

Por ser la palomilla de la papa (*Phthorimaea operculella*) la principal plaga de este cultivo y con el propósito de conocer el comportamiento de este insecto en el tiempo y el espacio, tenemos establecida una red de trampeo en distribución espacial en el área de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Huatabampo, con un total de 44 trampas de ala con feromona específica, de las cuales 34 corresponden a la región del Bajo Rio Mayo y 10 trampas en la zona Fuerte Mayo, dichas trampas se inspeccionan semanalmente, adicionalmente colocamos 2 trampas por predio sembrado de cultivo de papa para determinar la presencia de la plaga.

Actualmente hemos detectado que las capturas de adultos de palomilla de la papa se están adelantando e incrementando en algunas trampas como se muestra en el mapa y en el gráfico, consideramos de gran importancia dar la voz de alerta a todos los productores de papa para que estén pendientes del comportamiento de la plaga y de sus cultivos para realizar de ser necesario el control de este insecto en tiempo y forma, evitando que las poblaciones de palomilla se sigan incrementando para evitar daños posteriores.



Por nuestra parte seguiremos monitoreando esta plaga durante todo el ciclo vegetativo del cultivo para proporcionar a los productores la información al momento que nos la soliciten.

